

彭康学导团



彭·线代

线性代数期中试题集

(2022 版)



彭康书院课外学业辅导学友互助团

2021 年线代期中试题

一、选择题

1. 设 A 为 3 阶方阵, $|A|=3$, 则 $|-2A|$ = ()
 A. -6 B. 6 C. -24 D. 24
2. 设 A, B 为 n 阶方阵, 则下式中成立的是 ()
 A. $AB=BA$ B. $|AB|=|BA|$ C. $|A+B|=|A|+|B|$
 D. $(A+B)(A-B)=A^2-B^2$
3. 设 A 为 3 阶方阵, A^* 是 A 的伴随矩阵, $|A|=2$, 则 $|A^*|$ = ()
 A. 2 B. 4 C. 8 D. 16
4. 设同阶矩阵 A 与 B 等价, 则有 ()
 A. $|A|=|B|$ B. $|A| \neq |B|$ C. $r(A)=r(B)$ D. $r(A) \neq r(B)$
5. 设 A 为 n 阶可逆矩阵, 则 ()
 A. $(A^{-1})^* = |A|^{-1}A$ B. $(A^{-1})^* = |A|A$ C. $(A^{-1})^* = |A|^{-1}A^{-1}$ D. $(A^{-1})^* = |A|A^{-1}$
6. 设 A 是 n 阶方阵, B 是 m 阶方阵, $C = \begin{pmatrix} O & A \\ B & O \end{pmatrix}$, 则 $|C|$ = ()
 A. $|A| \cdot |B|$ B. $-|A| \cdot |B|$ C. $(-1)^{m+n}|A| \cdot |B|$ D. $(-1)^{mn}|A| \cdot |B|$
7. 设 A, B, C 均为 n 阶方阵, 且 $ABC=I$ (单位阵), 则下式未必成立的是 ()
 A. $BCA=I$ B. $CAB=I$ C. $ACB=I$ D. $C^T B^T A^T = I$
8. 设 $1 \times n$ 矩阵 $\alpha = \left(\frac{1}{2}, 0, 0, \dots, 0, \frac{1}{2}\right)$, $A = I - \alpha^T \alpha$, $B = I + 2\alpha^T \alpha$, 则 ()
 A. A, B 都不可逆 B. A 可逆但 B 不可逆
 C. A 不可逆但 B 可逆 D. A, B 都可逆且互为逆矩阵

9. 设矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 2 & -1 & 1 \\ -1 & 2 & -5 \end{pmatrix}$, 若有下三角可逆矩阵 P 和上三角可逆矩阵 Q 使 PAQ 为对角阵, 则 P, Q 可分别取为 ()

- A. $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ B. $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & -1 & 0 \\ -3 & 2 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$
- C. $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & -1 & 0 \\ -3 & 2 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ D. $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 2 & -3 \\ 0 & -1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$

二、填空题

1. 方程 $f(x) = \begin{vmatrix} a_1 & a_2 & a_3 & a_4 + x \\ a_1 & a_2 & a_3 + x & a_4 \\ a_1 & a_2 + x & a_3 & a_4 \\ a_1 + x & a_2 & a_3 & a_4 \end{vmatrix} = 0$ 的根为_____.
2. 点 $M(1, 2, 3)$ 到平面 $x - 2y + 2z + 3 = 0$ 的距离为_____.

3. 已知向量 \vec{b} 与 $\vec{a} = (1, 2, -2)$ 平行, 且 \vec{b} 与 z 轴正向夹角为锐角, 则 \vec{b} 的方向余弦为 _____.

4. 设矩阵 X 满足矩阵方程 $AX = B$, 其中 $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & 5 & 4 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$, 则 $X =$ _____.

三、解答题

1. 设 A, B 均为 n 阶方阵, $|A| = 5, |B| = 3, |A^{-1} + B| = 3$, 求 $|B^{-1} + A|$.

2. 计算行列式 $D = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 2+3a & 2+3b & 2+3c & 2+3d \\ 4a+5a^2 & 4b+5b^2 & 4c+5c^2 & 4d+5d^2 \\ 6a^2+7a^3 & 6b^2+7b^3 & 6c^2+7c^3 & 6d^2+7d^3 \end{vmatrix}$.

3. 求过直线 $L: \begin{cases} 2x - z = 0 \\ x + y - z + 5 = 0 \end{cases}$ 且垂直于平面 $\pi: 7x - y + 4z = 4$ 的平面方程.

4. 求过点 $P_0(-3, 5, 9)$ 且与直线 $L_1: \begin{cases} y = 3x + 5 \\ z = 2x - 3 \end{cases}$ 及 $L_2: \begin{cases} y = 4x - 7 \\ z = 5x + 10 \end{cases}$ 都相交的直线 L 的方程.

5. 设 B 是 $m \times n$ 矩阵, 且 BB^T 可逆, $A = I - B^T(BB^T)^{-1}B$.

(1) 证明: A 是对称矩阵, 且 $A^2 = A$; (2) A 是否可逆, 为什么?

6. 设有 $m \times n$ 矩阵 A , $r(A)$ 表示 A 的秩, 证明:

(1) $r(A) = r$ 的充分必要条件是存在 $m \times r$ 的列满秩矩阵 G 和 $r \times n$ 的行满秩矩阵 H , 使 $A = GH$.

(2) 若 $r(A) = r$, 则 A 可表示为 r 个秩为 1 的矩阵之和.

2019 年线代期中试题

一、选择题

1. 设 x, y, z 为两两互不相同的数, 则行列式 $\begin{vmatrix} x+y & z & z^2 \\ y+z & x & x^2 \\ z+x & y & y^2 \end{vmatrix} = 0$ 的充要条件是 ()

A. $xyz=0$ B. $x+y+z=0$ C. $x=-y, z=0$ D. $y=-z, x=0$

2. 设 A 为 n 阶方阵 ($n \geq 3$), 若 $A^3 = O$, 则下式中未必成立的是 ()

A. $A=O$ B. $(A^T)^3=O$ C. $A^4=O$ D. $|A|=O$

3. 设 A 为 n 阶可逆矩阵 ($n \geq 2$), I 为 n 阶单位矩阵, 则 $\left((A^*)^*\right)^{-1} =$ ()

A. $|A|^{n-1} I$ B. $|A|^{1-n} I$ C. $|A|^{n-1} A^*$ D. $|A|^{1-n} A^*$

4. $\begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}^{2018} \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}^{2019} =$ ()

A. $\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{bmatrix}$ B. $\begin{bmatrix} 1 & 3 & 2 \\ 4 & 6 & 5 \\ 7 & 8 & 9 \end{bmatrix}$ C. $\begin{bmatrix} 3 & 2 & 1 \\ 6 & 5 & 4 \\ 9 & 8 & 7 \end{bmatrix}$ D. $\begin{bmatrix} 7 & 8 & 9 \\ 4 & 5 & 6 \\ 1 & 2 & 3 \end{bmatrix}$

5. 设 $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ 均为非零向量且 $\vec{a} = \vec{b} \times \vec{c}, \vec{b} = \vec{c} \times \vec{a}, \vec{c} = \vec{a} \times \vec{b}$, 则 $\|\vec{a}\| + \|\vec{b}\| + \|\vec{c}\| =$ ()

A. 0 B. 1 C. 2 D. 3

二、填空题

1. 已知 x_1, x_2, x_3 为方程 $x^3 + px + q = 0$ 的三个根 $\begin{vmatrix} x_1 & x_2 & x_3 \\ x_2 & x_3 & x_1 \\ x_3 & x_1 & x_2 \end{vmatrix} =$ _____.

2. 设 $\alpha = (1, 2, 3), \beta = (1, -1, 1)$, 则 $(\alpha^T \beta)^{2020} =$ _____.

3. 设 A 为 3 阶方阵, 且 $|A| = 2$, 则 $\left|\left(\frac{1}{2} A^*\right)^{-1} - 3A\right| =$ _____.

4. 设有直线 $L_1: \frac{x-1}{9} = \frac{y-2}{8} = \frac{z-3}{5}, L_2: \frac{x+2}{2} = \frac{y-1}{1} = \frac{z}{1}$ 则过直线 L_1 且与 L_2 平行的平面方程为 _____.

5. 以 $A(1, 1, 1), B(2, 0, 1), C(0, 0, 1), D(1, 3, 2)$ 为顶点的四面体的体积为 _____.

三、解答题

1. 设有 n 元线性方程组 $Ax = b$, 其中 A 为三对角矩阵, 且

$$A = \begin{bmatrix} 2a & 1 & 0 & \cdots & 0 & 0 & 0 \\ a^2 & 2a & 1 & \cdots & 0 & 0 & 0 \\ 0 & a^2 & 2a & \cdots & 0 & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 2a & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & a^2 & 2a & 1 \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & a^2 & 2a \end{bmatrix}, x = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix}, b = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix}.$$

(1) 证明 $|A| = (n+1)a^n$; (2) a 为何值时, 该方程组有唯一解, 并在此时求 x_1 和 x_n .

2. 设 A 为 n 阶实矩阵, I 为单位阵, 满足 $AA^T = I$, 此时称 A 为正交矩阵, 若已知 $|A| < 0$, 求 $|A|$ 及 $|A+I|$.

3. 设有两条直线 $L_1: \begin{cases} x-y=3 \\ 3x-y+z=1 \end{cases}$ 和 $L_2: x+1 = \frac{y-1}{-2} = \frac{z}{2}$, 点 $M(1,0,-1)$.

(1) 求 L_1 的对称式方程; (2) 求点 M 到 L_1 的距离; (3) 研究 L_1 与 L_2 的位置关系.

4. 设矩阵 $B = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$, $C = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 3 & 4 \\ 0 & 2 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}$, I 为单位阵. 矩阵 A 满足 $A(I - C^{-1}B)^T C^T = I$, 求 A .

5. 设矩阵 $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & -2 & -1 & -2 \\ 4 & 1 & 2 & 1 \\ 2 & 5 & \mu & \lambda \end{bmatrix}$, 讨论矩阵 A 的秩.

6. 设 $A = (a_{ij})_{3 \times 3}$ 为非零实矩阵, A_{ij} 为 a_{ij} 的代数余子式, 且 $a_{ij} + A_{ij} = 0, (i, j = 1, 2, 3)$
 (1) 求 $|A|$; (2) 证明 A 为正交矩阵 (正交矩阵的定义参看第 2 题)

2018 年线代期中试题

一、选择题

- 若 n 阶行列式 $D = 0$ ，则 ()
 - D 中必有一行 (列) 元素全为零
 - D 中必有两行 (列) 的元素对应成比例
 - 以 D 为系数行列式的非齐次线性方程组必有唯一解
 - 以 D 为系数行列式的齐次线性方程组必有非零解
- 设 A, B 都是 n 阶方阵且等价，则必有 ()
 - 当 $|A| = a (a \neq 0)$ 时， $|B| = a$
 - 当 $|A| = a (a \neq 0)$ 时， $|B| = -a$
 - 当 $|A| \neq 0$ 时， $|B| = 0$
 - 当 $|A| = 0$ 时， $|B| = 0$
- 设 A 为 3 阶方阵，将 A 的第二行加到第一行得 B ，再将 B 的第一列的 -1 倍加到第二列得 C ，记 $P = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$ ，则 $C =$ ()
 - $C = P^{-1}AP$
 - $C = PAP^{-1}$
 - $C = P^TAP$
 - $C = PAP^T$
- 设四阶矩阵 $A = (\alpha, \gamma_2, \gamma_3, \gamma_4)$ ， $B = (\beta, \gamma_2, \gamma_3, \gamma_4)$ ，其中 $\alpha, \beta, \gamma_2, \gamma_3, \gamma_4$ 均为四维列向量，且已知 $|A| = 4$ ， $|B| = 1$ ，则 $|A+B| =$ ()
 - 5
 - 10
 - 40
 - 20
- 设单位向量 $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ 满足 $\vec{a} + \vec{b} + \vec{c} = \vec{0}$ ，则 $\vec{a} \cdot \vec{b} + \vec{b} \cdot \vec{c} + \vec{c} \cdot \vec{a} =$ ()
 - $-\frac{3}{2}$
 - -3
 - 0
 - 3

二、填空题

- 已知 n 阶行列式 D 的值为 $a \neq 0$ ，且 D 的每行元素之和都等于常数 b ，则 D 的 j 列 ($1 \leq j \leq n$) 元素的代数余子式之和 $A_{1j} + A_{2j} + \dots + A_{nj} =$ _____.
- 设 $D = \begin{vmatrix} 2 & 2 & 2 \\ a & b & c \\ a^2 & b^2 & c^2 \end{vmatrix}$ ，则 $D =$ _____.
- 设 $A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$ ， I 为 3 阶单位矩阵，则 $(A+3I)^{-1}(A^2-9I) =$ _____.
- 过点 $P_1(1, -2, 4)$ ， $P_2(3, 5, 7)$ 的对称式直线方程为 _____.
- 以 $A(5, 1, -1)$ ， $B(0, -4, 3)$ ， $C(1, -3, 7)$ 为顶点的三角形的面积为 _____.

三、解答题

1. 计算行列式 $D = \begin{vmatrix} 0 & 1 & 2 & 3 & 4 \\ 1 & 0 & 1 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 0 & 1 & 2 \\ 3 & 2 & 1 & 0 & 1 \\ 4 & 3 & 2 & 1 & 0 \end{vmatrix}$.

2. 设 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 均为 3 维列向量, 方阵 $A = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)$, $B = (\alpha_1 + 2\alpha_2, 2\alpha_2 + 3\alpha_3, 3\alpha_3 + \alpha_1)$, 已知 $\det(A) = a$, 求 $\det(B)$.

3. 设 4 阶矩阵 B 满足 $\left[\left(\frac{1}{2}A\right)^*\right]^{-1}BA^{-1} = 2AB + 12I$, 其中 $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 & 0 \\ 1 & 3 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \end{bmatrix}$, 求矩阵 B .

4. 设矩阵 $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 2 & 1 \\ 0 & -1 & a-3 & -2 & b \\ 3 & 2 & 1 & a & -1 \end{bmatrix}$, 试讨论矩阵 A 的秩.

5. 证明直线 $L_1: \frac{x+1}{3} = \frac{y+1}{2} = \frac{z+1}{1}$ 与 $L_2: x-4 = \frac{y+5}{-3} = \frac{z-4}{2}$ 位于同一平面, 并求这两条直线的交点坐标及所在平面的方程.

6. 已知 n 阶矩阵 $A = \begin{bmatrix} 2 & 2 & 2 & \cdots & 2 & 2 \\ 0 & 1 & 1 & \cdots & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & \cdots & 1 & 1 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \cdots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 1 \end{bmatrix}$.

(1) 求 A^{-1} .

(2) 求 A 中所有元素代数余子式的和 $\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n A_{ij}$.

2017 年线代期中试题

一、选择题

1. 设 A 是 2 阶方阵, B 是 3 阶方阵, 且 $|A|=2$, $|B|=-2$, 则 $|-|A|B| = (\quad)$
 A. 4 B. -4 C. 16 D. -16
2. 设 A, B 都是 n 阶方阵, 如果 A 和 B 的秩分别为 r 和 n , 则 $r(AB) - r(A) = (\quad)$
 A. 0 B. r C. n D. $m-r$
3. 设 A, B 均为 2 阶方阵, A^*, B^* 分别是 A, B 的伴随矩阵, 若 $|A|=1, |B|=2$, 则分块矩阵 $\begin{bmatrix} 0 & A \\ B & 0 \end{bmatrix}$ 的伴随矩阵为 (\quad)
 A. $\begin{bmatrix} 0 & A^* \\ 2B^* & 0 \end{bmatrix}$ B. $\begin{bmatrix} 0 & 2A^* \\ B^* & 0 \end{bmatrix}$ C. $\begin{bmatrix} 0 & 2B^* \\ A^* & 0 \end{bmatrix}$ D. $\begin{bmatrix} 0 & B^* \\ 2A^* & 0 \end{bmatrix}$
4. 已知 $P = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$, $A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{bmatrix}$, 若 $P^n A P^n = A$, 则以下选项中正确的是 (\quad)
 A. $m=5, n=4$ B. $m=5, n=5$ C. $m=4, n=5$ D. $m=4, n=4$
5. 设有直线 $l: \begin{cases} x+3y+2z+1=0 \\ 2x-y-10z+3=0 \end{cases}$ 及平面 $\pi: 4x-2y+z-2=0$, 则直线 $l (\quad)$
 A. 平行于 π B. 垂直于 π C. 在 π 上 D. 与 π 斜交

二、填空题

1. 若 $\begin{vmatrix} 1 & 0 & 2 \\ x & 3 & 1 \\ 4 & x & 5 \end{vmatrix}$ 中 $(1,2)$ 元的代数余子式 $A_{12} = -1$, 则 $A_{21} = \underline{\hspace{2cm}}$.
2. 设矩阵 A 满足 $A^2 + A = 4I$, 其中 I 为单位矩阵, 则 $(A-I)^{-1} = \underline{\hspace{2cm}}$.
3. 设 $\alpha = (1, 0, -1)^T$, 矩阵 $A = \alpha\alpha^T$, n 为正整数, 则 $A^n = \underline{\hspace{2cm}}$.
4. 已知 $\|a\|=1, \|b\|=2, (a, b) = \frac{\pi}{3}$, 则 $\|2a-b\| = \underline{\hspace{2cm}}$.
5. 若 4 点 $A(1, 0, -2), B(7, x, 0), C(-8, 6, 1), D(-2, 6, 1)$ 共面, 则 $x = \underline{\hspace{2cm}}$.

三、解答题

1. 计算行列式 $D = \begin{vmatrix} 0 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 1 & 0 & 3 & 4 & 5 \\ 1 & 2 & 0 & 4 & 5 \\ 1 & 2 & 3 & 0 & 5 \\ 1 & 2 & 3 & 4 & 0 \end{vmatrix}$.

2. 已知矩阵 A 的伴随矩阵 $A^* = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & -3 & 0 & 8 \end{bmatrix}$, 矩阵 B 满足方程 $ABA^{-1} = BA^{-1} + 3I$, 求 B .

3. 设矩阵 $A = \begin{bmatrix} a & -1 & -1 \\ -1 & a & -1 \\ -1 & -1 & a \end{bmatrix}$ 与矩阵 $B = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$ 等价, 求常数 a .

4. 讨论 n 阶方阵 $A = \begin{bmatrix} a & b & \cdots & b \\ b & a & \cdots & b \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ b & b & \cdots & a \end{bmatrix}$ ($n \geq 2$) 的秩.

5. 直线 L 过点 $P_0(1, 0, -2)$, 与平面 $\pi: 3x - y + 2z + 1 = 0$ 平行, 与直线 $L_1: \frac{x-1}{4} = \frac{y-3}{-2} = z$ 相交, 求 L 的对称式方程.

6. 设平面 π 与 $\pi_1: x - 2y + z - 1 = 0$ 垂直, 且与 π_1 的交线落在 yoz 平面上, 求 π 的方程.

2016 年线代期中试题

一、填空题

1. 关于 x 的代数方程 $\begin{vmatrix} x+1 & -4 & 2 \\ 3 & x-4 & 0 \\ 3 & -1 & x-3 \end{vmatrix} = 0$ 的全部根为_____.

2. 设 A 的伴随矩阵 $A^* = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & -3 & 0 & 8 \end{bmatrix}$, 则 $A^{-1} = \begin{bmatrix} & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \end{bmatrix}$.

3. 设向量 $\vec{a} = (1, 1, 1), \vec{b} = (1, 2, -3), \vec{c} = (0, -2, \lambda)$ 共面, 则 $\lambda =$ _____.

4. 设有向量 $\vec{a} = (1, 1, 1), \vec{b} = (1, 3, -3)$, 则向量 \vec{b} 在向量 \vec{a} 上的正交射影向量 $\text{Proj}_{\vec{a}} \vec{b} =$ _____.

5. 点 $P(1, 0, -1)$ 到直线 $L: \frac{x-1}{2} = \frac{y+2}{0} = \frac{z-4}{1}$ 的距离 $d =$ _____.

二、选择题

1. 已知四阶行列式 D , 其第 3 列元素分别为 1, 3, -2, 2, 它们对应的余子式分别为 3, -2, 1, 1, 则行列式 $D =$ ()

- A. -5 B. 5 C. -3 D. 3

2. 设 A 是 $m \times n$ 的矩阵, $r(A) = r$, 则 A 中 ()

- A. 必有不等于 0 的 r 阶子式, 所有 $r+1$ 阶子式均为 0
 B. 必有等于 0 的 r 阶子式, 没有不等于 0 的 $r+1$ 阶子式
 C. 没有等于 0 的 r 阶子式, 任何 $r+1$ 阶子式均为 0
 D. 至少有一个 r 阶子式不为 0, 没有等于 0 的 $r-1$ 阶子式

3. 设 A, B 为同阶可逆方阵, 则下列结论正确的是 ()

- A. $|A+B| = |A| + |B|$ B. $(AB)^T = A^T B^T$
 C. $(AB)^{-1} = A^{-1} B^{-1}$ D. $|AB| = |A| \cdot |B|$

4. 设三阶方阵 A 的行列式 $|A| = 2$, 则 $\left| \frac{1}{4}(2A)^* \right| =$ () (A^* 是 A 的伴随矩阵)

- A. $\frac{1}{2}$ B. 4 C. 16 D. 32

5. 设 $(\bar{a} \times \bar{b}) \cdot \bar{c} = 2$, 则 $\left[(\bar{a} + \bar{b}) \times (\bar{b} + \bar{c}) \right] \cdot \bar{c} =$ ()

- A. 1 B. 2 C. 4 D. 8

三、计算与证明题

1. 计算 n 阶行列式 $D_n = \begin{vmatrix} x & a & a & \cdots & a \\ a & x & a & \cdots & a \\ a & a & x & \cdots & a \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ a & a & a & \cdots & x \end{vmatrix}$.

2. 求矩阵 $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & -1 & b \\ 2 & 3 & a & 4 \\ 3 & 5 & 1 & 7 \end{bmatrix}$ 的秩, 其中 a, b 为参数.

3. 设矩阵 $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 & -1 \\ 1 & -1 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & -1 & 1 \end{bmatrix}$.

(1) 试求 A^2 及 A^{-1} .

(2) 若方阵 B 满足 $A^2 + AB - A^{-1} = I$ (其中 I 为 4 阶单位阵), 求矩阵 B .

4. 求过原点且与直线 $L_1: \frac{x+1}{1} = \frac{y+2}{2} = \frac{z-1}{1}$ 及直线 $L_2: \begin{cases} x=1 \\ y=-1+t \\ z=1+t \end{cases}$ 都平行的平面方程.

5. 求过点 (1,1,1) 且与两直线 $L_1: \frac{x}{1} = \frac{y}{2} = \frac{z}{3}$, $L_2: \frac{x-1}{2} = \frac{y-2}{1} = \frac{z-3}{4}$ 都相交的直线方程.

6. 设 A 为 n 阶非零实方阵, 且 $A^* = A^T$ (A^* 是 A 的伴随矩阵), 证明 A 可逆.

7. 设矩阵 $A = \begin{bmatrix} a & 1 & 0 \\ 1 & a & -1 \\ 0 & 1 & a \end{bmatrix}$, 且 $A^3 = O$.

(1) 求 a 的值.

(2) 若矩阵 X 满足 $X - XA^2 - AX + AXA^2 = I$, 其中 I 为 3 阶单位阵, 求 X .

2015 年线代期中试题

一、填空题

$$1. \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 3 & 4 \\ 1 & 4 & 9 & 16 \\ 1 & 8 & 27 & 64 \end{vmatrix} = \underline{\hspace{2cm}}.$$

$$2. \text{ 设 } M_{ij} \text{ 为行列式 } \begin{vmatrix} 5 & 8 & 2 & 9 \\ 3 & 6 & 4 & 7 \\ 0 & 3 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 0 & 4 \end{vmatrix} \text{ 的 } (i, j) \text{ 元素的余子式, 则 } 2M_{42} + 4M_{44} = \underline{\hspace{2cm}}.$$

3. 三个向量 $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ 共面的充要条件为 $\underline{\hspace{2cm}}$.

4. 设向量 $\vec{a} = (3, 2, 1), \vec{b} = (7, 5, 0)$, 则 \vec{b} 在 \vec{a} 上的射影 $(\vec{b})_{\vec{a}} = \underline{\hspace{2cm}}$.

5. 过点 $(2, -1, 3)$ 且与直线 $\frac{x+3}{7} = \frac{y}{0} = \frac{z+6}{2}$ 平行的直线方程为 $\underline{\hspace{2cm}}$.

6. 设 A 为 $m \times n$ 矩阵, P 为 m 阶可逆矩阵, 且 $PA = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 5 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$, 则 $r(A) = \underline{\hspace{2cm}}$.

7. 设 A, B 分别为 m 阶、 n 阶可逆方阵, 则 $\begin{bmatrix} 0 & A \\ B & 0 \end{bmatrix}^{-1} = \underline{\hspace{2cm}}$.

8. 设 A 为 3 阶矩阵, $|A| = 2$, 则 $|-3A^*| = \underline{\hspace{2cm}}$.

$$9. \begin{bmatrix} 1 & -2 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 2 & 6 \\ -1 & 1 & 0 \\ 3 & 2 & 4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{bmatrix} = \underline{\hspace{2cm}}.$$

10. 设 3 个向量 $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ 满足 $(\vec{a} \times \vec{b}) \cdot \vec{c} = 2$, 则 $[(\vec{a} + \vec{b}) \times (\vec{b} + \vec{c})] \cdot (\vec{c} + \vec{a}) = \underline{\hspace{2cm}}$.

11. 已知矩阵 $A = (a_{ij})_{3 \times 3}$ 的第一行元素为 $a_{11} = 1, a_{12} = 2, a_{13} = -1$, A 的伴随矩阵为

$$A^* = \begin{bmatrix} -7 & -4 & 9 \\ 5 & 3 & -7 \\ 4 & 2 & -5 \end{bmatrix}, \text{ 则 } A = \underline{\hspace{2cm}}.$$

12. 设 $\alpha_j (j=1, 2, 3)$ 均为 3 维列向量, 方阵 $A = [\alpha_1 \ \alpha_2 \ \alpha_3]$, $B = [\alpha_1 + 2\alpha_2 \ 2\alpha_2 + 3\alpha_3 \ -\alpha_3]$, 已知 $|A| = a$, 则 $|B| = \underline{\hspace{2cm}}$.

二、选择题

1. 如果齐次线性方程组 $\begin{cases} \lambda x_1 + x_2 + x_3 = 0 \\ x_1 + \lambda x_2 + x_3 = 0 \\ 3x_1 - x_2 + x_3 = 0 \end{cases}$ 有非零解, 则 λ 的值为 ()
- A. $\lambda \neq 1$ B. $\lambda = 1$ C. $\lambda \neq 3$ D. $\lambda = 3$
2. 设 A, B 为同阶方阵, 下列等式正确的是 ()
- A. $(AB)^T = A^T B^T$ B. $(AB)^* = A^* B^*$
- C. $A^2 - B^2 = (A+B)(A-B)$ D. $|AB| = |A||B|$
3. 设 A 为 n 阶可逆矩阵, 下列等式不正确的是 ()
- A. $|A^*| = |A|^{n-1}$ B. $A^* = |A|A^{-1}$ C. $A = \frac{1}{|A|}(A^*)^{-1}$ D. $(A^*)^{-1} = \frac{1}{|A|}A$
4. 设有两点 $A(1, -2, 3), B(3, 2, 1)$, 则向量 \overline{AB} 与 y 轴正方向的夹角是 ()
- A. $\arccos \frac{\sqrt{6}}{6}$ B. $\arccos \frac{\sqrt{6}}{3}$ C. $\arccos \left(-\frac{\sqrt{6}}{6}\right)$ D. $\arccos \left(-\frac{\sqrt{6}}{3}\right)$
5. 两条直线 $L_1: x+1 = \frac{y-1}{-2} = \frac{z}{2}$, $L_2: x+1 = y+4 = \frac{z}{-2}$, 则 L_1 与 L_2 的位置关系是 ()
- A. 异面 B. 相交 C. 平行不重合 D. 重合

三、计算题

1. 计算行列式 $\begin{vmatrix} a_1+b & a_2 & a_3 & \cdots & a_n \\ a_1 & a_2+b & a_3 & \cdots & a_n \\ a_1 & a_2 & a_3+b & \cdots & a_n \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_1 & a_2 & a_3 & \cdots & a_n+b \end{vmatrix}$ 的值.

2. 设 3 阶矩阵 A, B 满足 $2A^{-1}B = B = B - 4I$, 其中 I 是 3 阶单位矩阵.

(1) 证明: $A - 2I$ 可逆.

(2) 若 $B = \begin{bmatrix} 1 & -2 & 0 \\ 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}$, 求矩阵 A .

3. 设 $B = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{bmatrix}$, $P = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & -1 & 0 \\ 2 & 1 & 1 \end{bmatrix}$, 矩阵 A 满足 $AP = PB$, 求 A 及 A^5 .

4. 设四阶矩阵 $A = \begin{bmatrix} 1 & a & a & a \\ a & 1 & a & a \\ a & a & 1 & a \\ a & a & a & 1 \end{bmatrix}$ 的秩为 3, 试求常数 a 的值.

5. 求过点 $P_1(-1,0,2), P_2(1,1,1)$ 且与平面 $x+y+z+1=0$ 垂直的平面方程.

6. 求点 $P(1,2,3)$ 到直线 $\begin{cases} x+y-z-1=0 \\ 2x+z-3=0 \end{cases}$ 的距离.

四、证明题

1. 设 α 为 n 维非零列向量, $A=I-\alpha\alpha^T$, 其中 I 为 n 阶单位矩阵, 证明: $A^2=A \Leftrightarrow \alpha^T\alpha=1$.

2. 设 A, B 均为 n 阶方阵, 且满足 $A^2=I, B^2=I, |A|+|B|=0$, 证明: $|A+B|=0$.

2014 年线代期中试题

1. 计算下列行列式:

$$(1) |D| = \begin{vmatrix} 2 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 3 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 4 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 5 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 6 \end{vmatrix}$$

(2) 已知 A 是 3 阶矩阵, B 是 4 阶矩阵, 且 $|A|=12$, $|B|=-6$, 求矩阵 $D = \begin{pmatrix} 0 & \frac{1}{2}A \\ -B & C \end{pmatrix}$ 的行列式 $|D|$ 的值.

2. 已知 $|\bar{a} + \bar{b}| = 4$, $|\bar{a} - \bar{b}| = 18$, 求 $|\bar{a}|^2 + |\bar{b}|^2$ 与 $\bar{a} \cdot \bar{b}$.

3. 解答题:

(1) 已知 3 阶矩阵 A 满足: $A^3 + A + E = 0$, 证明 $A + 2E$ 可逆, 并求出 $(A + 2E)^{-1}$.

(2) 3阶矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 2 & 0 \\ 3 & 4 & 5 \end{pmatrix}$, 求 $(A^*)^{-1}$.

4. 已知直角坐标系中的4个点 $A(3, -1, 0)$, $B(-1, -1, 1)$, $C(3, 2, 1)$, $D(5, -\frac{5}{2}, -1)$, 这四个点是否在同一平面上? 若是, 请求出此平面方程; 若不是, 请说明理由.

5. 设矩阵 $A = (a_{ij})_{3 \times 3}$, 满足条件 $a_{33} = -1$ 及 $a_{ij} = A_{ij}, i, j = 1, 2, 3$, 其中 A_{ij} 是元素 a_{ij} 的代数余子式.

(1) 求 $|A|$. (2) 解线性方程组 $Ax = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$.

2013 年线代期中试题

1. 计算下列行列式:

$$D = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2+3\cos x_1 & 2+3\cos x_2 & 2+3\cos x_3 \\ 4\cos x_1+5\cos^2 x_1 & 4\cos x_2+5\cos^2 x_2 & 4\cos x_3+5\cos^2 x_3 \end{vmatrix}$$

2. 设 n 阶矩阵 A 与 B 均为非单位阵 I , 且 $AB = A + B - I$, 求行列式 $|A - I|$ 和 $|B - I|$ 的值.

3. 设 A 与 B 均为 n 阶正交矩阵 (即 $A^{-1} = A^T$, 且为实矩阵), 满足 $|A| + |B| = 0$, 求行列式 $|A + B|$ 的值.

4. 在线性方程组 $Ax = b$ 中, $A = (a_{ij})_{n \times n}$, $b = (b_1, b_2, \dots, b_n)^T$, A_{ij} 是 a_{ij} 的代数余子式, 已知

$$\sum_{k=1}^n a_{nk} A_{nk} = -1, \quad \sum_{k=1}^n b_k A_{kn} = 3, \quad \text{求 } x \text{ 的第 } n \text{ 个分量 } x_n \text{ 的值.}$$

5. 设 $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{pmatrix}$, 试用两种方法求 A^{-1} .

6. 设有直线 $L_1: \frac{x+3}{2} = \frac{y+2}{3} = \frac{z-6}{-4}$ 和 $\begin{cases} x-z=9 \\ y+4z=-17 \end{cases}$, 试判断这两条直线的位置关系. 若共面, 求它们所确定的平面方程; 若还相交, 求交点.

7. 设 n 阶矩阵 A 满足 $A^3 = 2I$, $B = A^2 - 2A + 2I$, 证明 B 可逆并求 B^{-1} .

8. 设 A 是 n 阶矩阵, $r(A) = r$, 证明: 必存在 n 阶可逆矩阵 B 及秩为 r 的 n 阶矩阵 C 满足 $C^2 = C$, 使 $A = BC$.



更多信息，请加入彭小帮 2.0 QQ 群：397499749

搜索微信公众号“彭康书院学导团”或扫描下方二维码，关注我们，了解更多学业动态，掌握更新学习资料。

本学期，我们组织了答疑志愿者周一到周五每晚在东 19-114 进行答疑活动，答疑课目主要为高数、线代、大物和一些专业课程。

欢迎同学们前往答疑，一起学习，共同进步！

