

函数性态

宁智伟

1. 单调性
2. 极值
3. 最值
4. 凹凸性, 拐点

单调性:

定理6.1 设 $f: I \rightarrow R$ 在 I 上连续, 在 I 内可导, 则下述命题成立:

- (1) f 在 I 上单调增(减)的充要条件是在 I 内 $f' \geq 0$ ($f' \leq 0$);
- (2) 若在 I 内 $f' > 0$ ($f' < 0$), 则 f 在 I 上严格单调增(减)

极值:

6.2 设 f 在 x_0 的某一领域内可导, 并且 $f'(x_0) = 0$

(1) 若 $x < x_0$ 时, $f'(x) \geq 0$; $x > x_0$ 时, $f'(x) \leq 0$, 则 f 在 x_0 处取极大值。

(2) 若 $x < x_0$ 时, $f'(x) \leq 0$; $x > x_0$ 时, $f'(x) \geq 0$, 则 f 在 x_0 处取极小值。

(3) 若 $f'(x)$ 在 x_0 的左右两侧符号不变, 则 f 在 x_0 处不取极值。

6.3 设 f 在 x_0 处二阶可导, 并且 $f'(x_0) = 0$, $f''(x_0) \neq 0$, 则当 $f''(x_0) > 0 (< 0)$ 时, f 在 x_0 处取级小 (大) 值。

极值

6.4 设函数 $f(x)$ 在点 x_0 处存在 n 阶导数, 且

$$f'(x_0) = f''(x_0) = f'''(x_0) = \cdots = f^{(n-1)}(x_0) = 0$$

, $f^{(n)}(x_0) \neq 0$

- (1) 当 n 为奇数时, $f(x)$ 在点 x_0 不取极值;
- (2) 当 n 为偶数时, $f(x)$ 在点 x_0 取极值, 且当 $f^{(n)}(x_0) < 0$ 时, $f(x)$ 在点 x_0 取最大值; 当 $f^{(n)}(x_0) > 0$ 时, $f(x)$ 在点 x_0 取得极小值



1. 函数在极值点的左右邻域内一定单调？

2. 若 $f'(x_0) > 0$ ，则存在 x_0 的某邻域，在此邻域内 $f(x)$ 单递增？

最值性:

由闭区间上连续函数的性质可知, 如果函数 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 则 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上一定存在最大最小值, 且最值为极值或者端点对应的函数值

一般是建立一个目标函数, 在某一区间内求解最优化问题, 例如最大容积, 最短路径, 最短用时...



根据临床数据分析知，在给病人注射一种降压药时，用药剂量 x (mg) ($x \leq 30$) 导致的血压下降量为 $D(x) = 0.025x^2(30 - x)$. 试问，注射药物剂量为多少时，血压下降幅度达到最大。

凹凸性与拐点

6.5 设函数 $f(x)$ 在区间 I 中二阶可导, 则

- (1) 若在 I 内恒有 $f''(x) > 0$, 则 $f(x)$ 的图像在 I 中是凹的;
- (2) 若在 I 内恒有 $f''(x) < 0$, 则 $f(x)$ 的图像在 I 中是凸的;

连续曲线上凹的图像段与凸的图像段的转变点称为该曲线的**拐点**。

凹凸性与拐点

设函数 $f(x)$ 在点 x_0 的某个领域内有二阶导数， $f''(x_0)=0$ ，如果在点 x_0 邻近两侧， $f''(x)$ 异号，则点 $(x_0, f(x_0))$ 是曲线 $y=f(x)$ 的一个拐点

斜渐进线

若直线 $y=kx+b$ 是曲线 $y=f(x)$ 当 $x \rightarrow +\infty$ 时的一条斜渐进线，则有

$$(1) \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = k \quad ;$$

$$(2) \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x) - kx] = b.$$

例如：求 $y = \frac{x^2+2x}{x+1}$ 的渐进线

判定曲线 $y = (x - 1)\sqrt[3]{x^5}$ 的凹凸性，并求拐点。

$$f'(x) = x^{\frac{5}{3}} + \frac{5}{3}(x - 1)x^{\frac{2}{3}} = \frac{8}{3}x^{\frac{5}{3}} - \frac{5}{3}x^{\frac{2}{3}}, \quad x \in (-\infty, +\infty)$$

$$f''(x) = \frac{10}{9} \cdot \frac{4x - 1}{\sqrt[3]{x}}, \quad x \neq 0$$

x	$(-\infty, 0)$	0	$(0, \frac{1}{4})$	$\frac{1}{4}$	$(\frac{1}{4}, +\infty)$
$f''(x)$	+	不存在	-	0	+
$f(x)$	下凸	拐点	下凹	拐点	下凸


$$1. \frac{|a+b|}{\pi+|a+b|} \leq \frac{|a|}{\pi+|a|} + \frac{|b|}{\pi+|b|}$$

2. 若 $0 \leq x_1 < x_2 < x_3 \leq \pi$, 证明:

$$\frac{\sin x_2 - \sin x_1}{x_2 - x_1} > \frac{\sin x_3 - \sin x_2}{x_3 - x_2}$$

治学团后续还会推出一系列相关活动，想继续了解的可以扫描屏幕前二维码关注我们的公众号。欢迎大家扫码关注哦！！



谢谢大家